

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
СУПРАДИН®

Регистрационный номер: П N015220/01

Торговое название препарата

Супрадин®.

Международное непатентованное название

-

Лекарственная форма

Таблетки шипучие.

Состав:

1 таблетка содержит

Активные вещества:

Витамин А (ретинол) в форме витамина А пальмитата	3333 МЕ
Витамин В ₁ (тиамина гидрохлорид) в форме тиамин монофосфорной кислоты эфира хлорида 24,7 мг	20,0 мг
Витамин В ₂ (рибофлавин) в форме рибофлавина натрия фосфата дигидрата 6,82 мг	5,0 мг
Витамин В ₆ (пиридоксина гидрохлорид)	10,0 мг
Витамин В ₁₂ (цианокобаламин)	5,0 мкг
Витамин С (аскорбиновая кислота)	150,0 мг
Витамин D ₃ (колекальциферол)	500 МЕ
Витамин Е (DL-альфа-токоферола ацетат)	10,0 мг
Биотин	0,25 мг
Кальция пантотенат	11,6 мг
Фолиевая кислота	1,0 мг
Никотинамид	50,0 мг
<i>а также минералы и микроэлементы</i>	
Кальций в форме кальция глицерофосфата и в форме кальция пантотената	51,3 мг
Магний в форме магния глицерофосфата	5,0 мг
Железо в форме железа карбоната, сахарата	1,25 мг
Марганец в форме марганца сульфата (моногидрата)	0,5 мг

Фосфор в форме кальция глицерофосфата, в форме магния глицерофосфата, в форме тиамин монофосфорной кислоты эфира хлорида	47,0 мг
Медь в форме меди сульфата (безводного)	0,1 мг
Цинк в форме цинка сульфата (моногидрата)	0,5 мг
Молибден в форме натрия молибдата (дигидрата)	0,1 мг

Вспомогательные вещества: сахароза 1086,384 мг, маннитол 17,25 мг, тартаровая кислота 1600,0 мг, натрия гидрокарбонат 1100,0 мг, сахарин натрия 18,0 мг, лимонный ароматизатор permaseal 60.827-7 60,0 мг, лимонный ароматизатор permastable 3206 100,0 мг.

Описание

Цилиндрическая, плоская таблетка от бледно-желтого до светлого-желтого цвета, с вкраплениями более темного и более светлого цвета, растворяется в воде с выделением пузырьков, образуя зеленовато-желтый, непрозрачный, с небольшим осадком раствор с запахом лимона.

Фармакотерапевтическая группа

Средство, влияющее на метаболические процессы; поливитаминно-минеральный комплекс.

Код АТХ: A11AA04

Фармакологические свойства

Определяются комплексом входящих в состав витаминов и минералов. Супрадин содержит 12 витаминов в сочетании с минералами и редкими элементами, являющихся важными факторами метаболических процессов.

Витамины необходимы для метаболизма углеводов, образования запасов энергии, метаболизма липидов, нуклеиновых кислот и белков, а также для синтеза коллагена, нейромедиаторов и т.д.

Помимо участия в основных метаболических реакциях, витамины принимают участие в регуляции и координации метаболических процессов. Витамины необходимы для роста костей, заживления ран, для поддержания нормального состояния сосудов, микросомального метаболизма лекарств и детоксикации, иммунного статуса, для развития и дифференциации тканей и т.д.

За исключением известных последствий острой недостаточности витаминов, растущий организм проявляет определенную потребность в витаминах, что позволяет предупреждать заболевания и поддерживать умственное и физическое состояние на высоком уровне.

Недостаток витаминов наблюдается в следующих случаях:

— при увеличенной потребности (период роста, беременности, период грудного вскармливания, в пожилом возрасте, при выздоровлении, лечении антибиотиками и при химиотерапии);

— при сниженном потреблении (снижение веса и другие несбалансированные диеты, в пожилом возрасте, желудочно-кишечные заболевания).

При указанных состояниях редко наблюдается недостаток только одного из витаминов. Кроме того, нарушается поступление наиболее распространенных минералов и редких элементов.

Препарат Супрадин создан как полный мультивитаминный комплекс, способствующий предупреждению общих авитаминозов и позволяющий проводить их лечение.

Показания к применению

Препарат применяют при профилактике и лечении гипо- и авитаминозов и недостатке минеральных веществ, в том числе:

- при неполноценном и несбалансированном питании (диеты);
- при повышенных физических и умственных нагрузках;
- в период выздоровления после продолжительных и/или тяжело протекающих заболеваний, в том числе инфекционных;
- в комплексной терапии хронического алкоголизма;
- в комплексном лечении при назначении антибиотикотерапии, химиотерапии.

Противопоказания

Гиперчувствительность, в том числе при аллергии на один или несколько компонентов препарата, а также при наличии гипервитаминоза А и D, гиперкальциемии, почечной недостаточности и в период лечения ретиноидами.

Способ применения и дозы

Внутрь, предварительно растворив в стакане воды.

Взрослые и подростки старше 12 лет: 1 таблетка шипучая в день, или по указанию врача.

Без рекомендации врача препарат не следует принимать в дозах, превышающих вышеуказанные, а также детям до 12 лет.

Побочное действие

Аллергические реакции к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не принимать одновременно другие поливитаминные препараты.

Особые указания

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что совершенно безвредно, и объясняется наличием в препарате рибофлавина.

Таблетка содержит около 300 мг натрия (эквивалентно 700 мг поваренной соли).

Пациентам, соблюдающим диету с минимальным потреблением соли, рекомендуется принимать драже.

Таблетка содержит около 1000 мг кристаллического сахара (сахарозы). При приеме рекомендуемой суточной дозы это количество пренебрежимо мало даже при необходимости соблюдения противодиабетической диеты (1 г кристаллического сахара соответствует 0,1 хлебной единицы).

Беременность и период грудного вскармливания

Можно принимать во время беременности и в период грудного вскармливания при условии соблюдения рекомендуемой ежедневной дозы. Нет данных, указывающих на риск для плода в случае приема препарата в рекомендованных дозах во время беременности.

Форма выпуска

По 10 таблеток, завернутых в фольгу Al/бумага, помещают в цилиндр, изготовленный из алюминия или полипропилена, закрывают пластмассовой крышкой. 1 или 2 цилиндра вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С, предохранять от нагревания и влаги.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Отпуск из аптек

Без рецепта врача.

Производитель

ЗАО «Байер», Россия

Произведено: Делфарм Гайярд, 33,
р/у д'Индюстри, 74240 Гайярд, Франция

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2.

Тел.: +7(495) 231-12-00

Факс: +7(495) 231-12-02

Данная версия инструкции действует с 04.07.2014 г.